

Mastoplastica e Gravidanza

(dott. Egidio Riggio/mastoplastica-additiva/foto)

Articoli

Guidaestetica.it (/mastoplastica-additiva/articoli - 27 mar 2017)



Cosa sapere, come comportarsi prima e dopo la pianificazione di un'operazione al seno e di una prima o successiva gravidanza?

Il primo dubbio di molte donne è se l'effettuazione di una **mastoplastica** possa interferire con una futura gravidanza o con l'allattamento. Il secondo dubbio riguarda la validità o meno di sottoporsi a mastoplastica prima di una eventuale gravidanza, in altre parole se la gravidanza possa rovinare il risultato ottenuto con la chirurgia.

Chiediamolo al dott. **Egidio Riggio** (<http://www.guidaestetica.it/centri/dott-egidio-riiggio>).

Sono numerose le donne fra i 20 ed i 35 anni che scelgono di sottoporsi ad una mastoplastica. La maggioranza richiede di aumentare con protesi il proprio piccolo seno. Meno frequentemente si tratta di riduzione di mammelle molto grandi o pendenti oppure di asimmetrie dello sviluppo puberale. Ha poco senso aspettare una ipotetica gravidanza, che sempre più spesso, viene programmata ben oltre i 30 anni di età, per avere un seno bello e armonioso, e più o meno florido. Alla domanda se il risultato estetico viene compromesso da gravidanza ed allattamento preferisco dare due risposte. La prima è: generalmente, nelle mie pazienti, il seno resta bello nonostante allattamenti, anche ripetuti, come mostrano le foto. Pu magari perdere un minimo di tonicità e volume (ma le protesi mantengono forma e volume di partenza). La seconda risposta è: il mantenimento del risultato è possibile solamente se si rispetta l'anatomia e la funzione della mammella durante la chirurgia. Purtroppo, vuoi per disinteresse vuoi per scarsa

Articoli correlati



I divieti del post operatorio della mastoplastica additiva (/articoli/i-divieti-del-postoperatorio-dellamastoplastica-additiva)

Guidaestetica.it - 30 nov 2016



Come eliminare la cellulite?

Guidaestetica.it - 3 gen 2012

esperienza, molti chirurghi utilizzano tecniche meno conservative della ghiandola mammaria, creando cicatrici non necessarie che aumenteranno rischio di atrofia e di incapacità ad allattare oppure pianificando gli interventi in modo non corretto.

Quali accorgimenti bisogna seguire per poter preservare tutte le potenzialità della mammella e le funzioni connesse ad un fisiologico allattamento?

E' importante preservare la capacità di poter allattare- Il latte materno è importante per una crescita sana del bambino nei suoi primi mesi di vita. Frequentemente i chirurghi non prestano attenzione alla delicata preservazione della sensibilità e dell'apporto di flusso sanguigno della mammella, quando progettano l'intervento. Per me, al contrario, qualità delle tecniche chirurgiche, durata della protesi e del risultato estetico, e preservazione della funzione del seno (allattamento) sono priorità assolute. Il mio metodo di mastoplastica, Zenith, rispetta tali dettami.

In cosa consistono queste priorità per una giovane donna?

Stare attenti alla scelta delle tecniche di dissezione interna della ghiandola mammaria (vale per l'aumento con protesi e, ancor di più in caso di mastopessi o di mastoplastica riduttiva). Prestare attenzione alla qualità della protesi (protesi ben note e studiate da molti anni, con sistemi di fabbricazione controllati). Preferire una tecnica sottopettorale, preferibilmente dualplane, che mantiene più afflusso di sangue al seno e quindi maggiore apporto di sostanze nutritive e di calore. Negli ultimi dieci anni ho messo definitivamente a punto una tecnica dualplane, più efficiente e sicura di quelle applicate dagli altri chirurghi plastici.

Donne che hanno il seno rifatto possono allattare il proprio bambino? E se hanno la montata latte?

Ammesso che la propria ghiandola produca latte, non a tutte le donne questo succede, nutrire col latte materno ha la sua importanza per i primi mesi di vita. Non vi è nessuna interferenza tra allattamento e protesi al seno. Anche le interferenze con la montata latte sono rare. Già anni fa studi scientifici internazionali hanno rilevato la presenza di microparticelle di silicone nel latte materno che per non creano alcun problema al lattante in quanto il silicone è inerte, non provoca allergie, non è dannoso e comunque non viene assorbito dall'intestino finendo nelle feci del neonato. Per di più le protesi di nuova generazione, con gel ad alta coesività, dovrebbero risentire ancor meno di questo fenomeno. Chiaramente la qualità della protesi fa la differenza perché non dobbiamo pensare solo al silicone che, come detto, è biologicamente inerte ma ad alcune sostanze, alcune impurità, rilasciate dal processo di fabbricazione che possono danneggiare i nostri tessuti. Vedi cosa è successo con le protesi PIP, alcuni anni fa. Per questo insisto sempre con le mie pazienti, soprattutto se giovani, a scegliere protesi di aziende ben note, presenti sul mercato da tanti anni, e non optare per novità poco studiate o, peggio, per protesi di basso costo pur di risparmiare 500-1000 (tel:500-1000) euro.

Quanto tempo dovrebbe trascorrere fra la mastoplastica e l'inizio di una gravidanza? E' vero che debba passare un anno?

Non sono a conoscenza di documentazioni scientifiche che dimostrino l'efficacia di un determinato lasso di tempo che debba necessariamente intercorrere fra l'operazione di mastoplastica additiva ed una futura gravidanza. Consiglio a chi pensasse di intraprendere la gravidanza nei prossimi 6 mesi, di aspettare a sottoporsi alla mastoplastica e farlo dopo aver visto gli effetti subiti dal seno in seguito a gravidanza ed allattamento. Non serve far passare un anno intero! Non serve preoccuparsi se si scopre di essere incinta dopo pochi mesi dall'operazione. In ogni intervento al seno con protesi la guarigione completa e l'assestamento definitivo del risultato estetico si raggiungono dopo 4-5 mesi. Trascorso questo periodo, quindi, nessun timore. A rafforzamento di questa affermazione, bisogna anche tenere in considerazione che nei primi 2-3 mesi di gravidanza le mammelle ricevono ancora poche stimolazioni ormonali.

L'allattamento rovina il seno operato?

Guidaestetica.it - 3 gen 2012



L'effetto peggiorativo può essere evidente negli impianti sotto ghiandolari. In tantissime miei pazienti con impianti sotto pettorali dualplane, che hanno avuto successivamente bambini, il seno ha acquisito, semmai, maggior naturalezza. Si può notare una perdita di un po' di volume ed un modesto rilassamento dei tessuti sovrastanti la protesi.

Una o più gravidanze, uno o più anni di allattamento conducono sempre allo svuotamento del seno, alla perdita di una bella forma di seno che, sebbene piccolo di volume, era presente prima della gravidanza. Cosa spinge le donne a pensare alla mastoplastica subito dopo la gravidanza?

Il vedere "appassire" come succede ad un bel fiore oramai secco il proprio seno è vissuto molto male da tutte le donne. In particolare se si è ancora giovani, è molto deprimente. Ritrovare la propria femminilità e una maggiore autostima di sé è quello che le donne da me operate mi riferiscono di aver provato dopo la mastoplastica.

Vantaggi e svantaggi della mesoterapia (/articoli/vantaggi-esvantaggi-dellamesoterapia)

Guidaestetica.it - 14 feb 2011



La sterilizzazione femminile permanente: di che si tratta e le sue conseguenze (/articoli/sterilizzazione-femminile-permanente-di-che-si-tratta-e-le-sue-conseguenze)

Guidaestetica.it - 25 giu 2012



Cocaina e chirurgia estetica, quali effetti? (/articoli/cocaina-chirurgia-estetica-qualieffetti)

Guidaestetica.it - 14 gen 2014



(/esperienze/condividi_la_tua_esperienza?sev=193)

Quanto tempo deve passare fra il termine di una gravidanza e l'operazione di mastoplastica?

Naturalmente si dovrà aspettare l'assestamento fisiologico dopo gravidanza ed allattamento. Consiglio di effettuare la prima visita almeno 2-3 mesi dopo il termine dell'allattamento giornaliero, non prima perché le valutazioni precoci potrebbero sottostimare la necessità di un riempimento con protesi di volume maggiore, e pianificare l'operazione a 6 mesi di distanza dal termine dell'allattamento. Qualora la donna non abbia praticamente allattato, conviene sempre passino 3 mesi per attendere la regressione del seno post-gravidico per poter valutare i reali difetti di volume e di forma. Successivamente procedere all'intervento almeno 4-6 mesi dopo il parto.



Donna di 31 anni, progettazione per specifica protesi anatomica da 410 grammi, da una prima ad una terza



Controllo dopo 9 mesi dalla mastoplastica dual-plane secondo Riggio (Zenith System)



Controllo dopo 3 anni dalla mastoplastica, 1 mese dopo il primo parto



Controllo dopo 9 anni dalla mastoplastica, 15 mesi dopo il secondo parto ed allattamento

Hai domande riguardo alla mastoplastica e la gravidanza? Dubbi? Pubblicali nel nostro Forum (<http://www.guidaestetica.it/forum>)! Ti aspettiamo.

Commenti (7)



AnnaMar (/user/annamar) · Viterbo (Città) · 29 mar 2017

Salve Dottore! Interessantissimo questo articolo. Grazie per tutte le informazioni... Tra l'altro il risultato è incredibile. Complimenti!

Rispondi

ERIGGIO (/User/Eriggio) · Milano (Città) · 30 mar 2017

Informare, studiare, aggiornare e offrire metodiche più sicure sono doveri ai quali ogni professionista dedito alla salute delle persone dovrebbe attenersi. Pertanto, ho fatto solo il mio dovere, di medico, cercando di dare risposta chiare utili per tutte quelle donne, come Lei, attente alla cura del proprio seno a 360 gradi. Comunque la ringrazio tanto per i

complimenti! Dott. Egidio Riggio
Rispondi



Pigra90 (/user/pigra90) · Bergamo (Città) · 30 mar 2017
Dopo quanto bisogna sostituire le protesi? Sapevo dopo 10 anni ...
Rispondi

ERIGGIO (/User/Eriggio) · Milano (Città) · 30 mar 2017

Con le protesi di ultime generazioni non vi è più una reale scadenza. La maggior parte delle protesi durano oltre i dieci anni, alcune venti o più anni. Nel caso singolo non è prevedibile perché le protesi dentro il nostro corpo si usurano, si deformano e si rompono in tempi variabili ed individuali. Certamente, di alcune protesi con gel più coesivo e di qualità superiore, la probabilità che una protesi si trovi rotta dopo pochi anni e prima di dieci, è inferiore al 10%. Per protesi Low cost o protesi con gel meno coesivo e qualitativamente inferiori la probabilità di rottura nei primi dieci anni pu essere del 30-40% almeno. Saluti. Dott. Egidio Riggio
Rispondi



Crisc1 (/user/crisc1) · Olcenengo · 30 mar 2017
Molto interessante l'articolo! L'ho ripubblicato nel forum dove ci sono un sacco di donne che cercano questo tipo di informazioni: <http://www.guidaestetica.it/forum/seno-stupendo-dopo-la-gravidanza> (<http://www.guidaestetica.it/forum/seno-stupendo-dopo-la-gravidanza>)
Rispondi

Rispondi

ERIGGIO (/user/eriggio) · Milano (Città) · 30 mar 2017

Mi sembra sia stata ottima la sua scelta. Cordialmente. Dott. Egidio Riggio
Rispondi



Manolita (/user/manolita) · Trieste (Città) · 31 mar 2017
Salve dottore ... forse può darci qualche consiglio qui? Le lascio il link.
<http://www.guidaestetica.it/forum/togliere-le-protesi-130> (<http://www.guidaestetica.it/forum/togliere-le-protesi-130>)
Rispondi

Lascia il tuo commento

Invia

Ultimi centri

Oscar Santuro (/centri/oscar-sant...
Dr. Francesco Somma (/centri/dr-...
Dott.ssa Giulia Bianchi (/centri/do...
BeautyMed (/centri/beautyMed)
MedicFisio Center S.A.S. (/centri/med...

Province Top

Estetica Roma (/centri/roma)
Estetica Milano (/centri/milano)
Estetica Napoli (/centri/napoli)
Estetica Torino (/centri/torino)
Estetica Bologna (/centri/bologna)

Servizi per provincia

Botox Roma (/centri/botulino/roma)
Filler Roma (/centri/filler/roma)
Filler ialuronico Roma (/centri/aci...
Trattamenti cellulite Roma (/centri...
Rughe Roma (/centri/rughe/roma)

Ultime esperienze

Sono intenzionata a fare una blefaro...
Sono intenzionata a farmi fare un bot... Ho fatto una pulizia del viso e... (/lifti...

Ricerche frequenti

Chirurgia Estetica (/centri/chirurgia-e...
Dentisti (/centri/dentisti)
Dimagrire (/dieta)
Medicina estetica (/centri/medicina-este...
Dermatologia (/centri/dermatologia-este...
Rinoplastica (/centri/rinoplastica)

Ritornare alla ricerca

Dermatologo (/dermatologo-ts)
Ringiovanimento Viso (/ringiovanime...
Lifting Cosce (/lifting-cosce-ts)
Chirurgia Del Capello (/chirurgia-del...
Cavitazione (/cavitazione-ts)
Il più cercato (/lomasbuscado)

Vorrei fare la liposcultura...il mio proble...
Tatuaggio giovanile (/rimozione-tatuaggi...

GuidaEstetica

[Chi siamo? \(/quienes\)](#)

[Guidelines della Comunità \(/comunit...](#)

[Condizioni legali \(/aviso_legal\)](#)

[Regolamento del concorso \(/regolam...](#)

[Protezione dei dati \(/proteccion_datos\)](#)

[Promozioni \(/offerte\)](#)

[Articoli \(/articoli\)](#)

Profilo

[Entra \(/profile/login\)](#)

[Registrati \(/profile/register\)](#)

Professionisti

[Accesso Dottori \(/front/user_account...](#)

[Piano Premium \(/potenciales\)](#)

Guidaestetica.it nel tuo Paese

Seguici



Scarica la App

<https://twitter.com/guidaestetica>

<https://www.facebook.com/GuidaEstetica.it><https://app.appsflyer.com/com.multiestetica>



Da sportiva, dopo anni di allenamento, ...

gratis! Unisciti alla piú grande community di Estetica e scopri la tua versione piú bella

Italia



[site&c=footerdesktopandroid](#)

<https://app.appsflyer.com/id1149340927?>

pid=in-
pid=insite&c=footerdesktopios)